

# Bev+mFOLFOX6療法 (大腸がん)

主な診療科：内科

1サイクルの日数：14日

催吐性リスク：中等度

## レジメン内容

Rp	薬剤名	投与方法	投与時間 (投与速度)	Day													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デキサメタゾン錠	内服	-		●	●											
2	ペバシズマブ注 (5mg/kg) 生理食塩液 100mL	点滴静注	初回は90分 忍容性があれば 2回目は60分 3回目は30分	●													
3	デキサメタゾン注 パロノセトロン注 生理食塩液 50mL	点滴静注	30分	●													
4	オキサリプラチン注 (85mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖液 250mL	点滴静注	120分 (Rp4とRp5は同時投与)	●													
5	レボホリナート注 (200mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖液 250mL	点滴静注	120分 (Rp4とRp5は同時投与)	●													
6	5-FU注 (400mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖液 50mL	点滴静注	急速点滴静注	●													
7	5-FU注 (2400mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液で total 92mL	点滴静注	インフューザーポンプで 46時間		●												

### 【備考】

吐き気の状態に応じてアプレピタントを併用する場合があります。