

FOLFIRINOX療法 (臍がん)

主な診療科：内科

1サイクルの日数：14日

催吐性リスク：高度

レジメン内容

Rp	薬剤名	投与方法	投与時間 (投与速度)	Day														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	アプレピタント カプセル day1 : 125mg day2-3 : 80mg	内服	-	●	●	●												
2	デキサメタゾン錠	内服	-		●	●	●											
3	デキサメタゾン注 パロセトロン注 生理食塩液 50mL	点滴静注	30分	●														
4	オキサリプラチン注 (85mg/m ²) 5%ブドウ糖液 250mL	点滴静注	120分	●														
5	レボホリナート注 (200mg/m ²) 5%ブドウ糖液 250mL	点滴静注	120分	●														
6	イリノテカン注 (180mg/m ²) 5%ブドウ糖液 250mL	点滴静注	90分 レボホリナート開始30分後 に側管から	●														
7	5-FU注 (400mg/m ²) 5%ブドウ糖液 50mL	点滴静注	急速点滴静注	●														
8	5-FU注 (2400mg/m ²) 生理食塩液で total 92mL	点滴静注	インフューザーポンプで 4 6時間		●													

【備考】

特になし。