

IRIS療法 (大腸がん)

主な診療科：内科

1サイクルの日数：28日

催吐性リスク：中等度

レジメン内容

Rp	薬剤名	投与方法	投与時間 (投与速度)	Day																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デキサメタゾン錠	内服	-		●	●												●	●					
2	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合錠	内服	1日2回	●(夕)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(朝)						
3	デキサメタゾン注 パロノセトロン注 生理食塩液 50mL	点滴静注	30分	●													●							
4	イリノテカン注 (125mg/m ²) 生理食塩液 500mL	点滴静注	90分	●													●							
5	生理食塩液 50mL	点滴静注	15分	●													●							

【備考】

吐き気の状態に応じてアプレピタントを併用する場合があります。

【テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム投与量】

1.25m²未満 : 40mg/回
 1.25m²~1.5m² : 50mg/回
 1.5m²以上 : 60mg/回

【腎機能低下時のテガフル・ギメラシル・オテラシルカリウムの用量】

60mL/min ≤ Ccr < 80mL/min : 必要に応じ1段階減量
 30mL/min ≤ Ccr < 60mL/min : 原則1段階減量
 Ccr < 30mL/min : 投与禁忌