

R-CHOP療法 (悪性リンパ腫)

主な診療科：内科

1サイクルの日数：21日

催吐性リスク：高度

レジメン内容

Rp	薬剤名	投与方法	投与時間 (投与速度)	Day																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	プレドニゾン錠 100mg/body	内服	-	●	●	●	●	●																
2	d-クロルフェンラミン注	静注	-	●																				
3	リツキシマブ注 生理食塩液 500mL	点滴静注	0~30分：50mg/hr その後30分毎に50mg/hr ずつ速度を上げる (MAX:400mg/hr) 2回目以降は100mg/hr開始、 その後30分毎に100mg/hr ずつ速度を上げる	●																				
4	グラネセトン注	点滴静注	15分	●																				
5	ドキシソルピシン注 (50mg/m ²) 5%ブドウ糖液 20mL	静注	-	●																				
6	ピンクリスチン注 (1.4mg/m ²) 5%ブドウ糖液で 0.1mg/mL	静注	-	●																				
7	シクロホスファミド注 (750mg/m ²) 生理食塩液 500mL	点滴静注	120分	●																				

【備考】

高度催吐性リスクのレジメンですが、高用量のプレドニゾロンを5日間投与するため、アプレピタントは使用しません。