

RAM+FOLFIRI療法 (大腸がん)

主な診療科：内科

1サイクルの日数：14日

催吐性リスク：中等度

レジメン内容

Rp	薬剤名	投与方法	投与時間 (投与速度)	Day														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	デキサメタゾン錠	内服	-		●	●												
2	ラムシルマブ注 (8mg/kg) 生理食塩液で total 250mL	点滴静注	初回は60分 忍容性があれば 2回目以降は30分 まで短縮可能	●														
3	デキサメタゾン注 パロノセトロン注 d-クロルフェニラミン注 生理食塩液 50mL	点滴静注	30分	●														
4	イリノテカン注 (150mg/m ²) 5%ブドウ糖液 250mL	点滴静注	90分 (Rp4とRp5は同時投与)	●														
5	レボホリナート注 (200mg/m ²) 5%ブドウ糖液 250mL	点滴静注	120分 (Rp4とRp5は同時投与)	●														
6	5-FU注 (400mg/m ²) 5%ブドウ糖液 50mL	点滴静注	急速点滴静注	●														
7	5-FU注 (2400mg/m ²) 生理食塩液で total 92mL	点滴静注	インフューザーポンプで 4 6時間		●													

【備考】

吐き気の状態に応じてアプレピタントを併用する場合があります。