

S-1+DOC療法 (胃がん)

主な診療科：内科

1サイクルの日数：21日(1~7サイクル)

42日(8~術後1年)

催吐性リスク：軽度

レジメン内容

Rp	薬剤名	投与方法	投与時間 (投与速度)	Day																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	~29	~42	
1	テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム配合錠	内服	1日2回 ★1~7サイクル	●(夕)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(朝)											
			1日2回 ★7サイクル~術後1年	●(夕)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(朝)	
2	デキサメタゾン錠	内服	- ★2~7サイクル		●	●																					
3	デキサメタゾン注 生理食塩液 50mL	点滴静注	30分 ★2~7サイクル	●																							
4	ドセタキセル注(40mg/m ²) 5%ブドウ糖液 250mL	点滴静注	60分 ★2~7サイクル	●																							
5	生理食塩液 50mL	点滴静注	15分 ★2~7サイクル	●																							

【備考】

吐き気の状態に応じてアプレピタントを併用する場合があります。

7サイクル~術後1年のS-1は2週間内服、1週間休薬になることもあります。

【テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム投与量】

1.25m²未満 : 40mg/回

1.25m²~1.5m² : 50mg/回

1.5m²以上 : 60mg/回

【腎機能低下時のテガフル・ギメラシル・オテラシルカリウムの用量】

60mL/min ≤ Ccr < 80mL/min : 必要に応じ1段階減量

30mL/min ≤ Ccr < 60mL/min : 原則1段階減量

Ccr < 30mL/min : 投与禁忌