

# SOX療法 (胃がん)

主な診療科：内科

0

1サイクルの日数：21日

催吐性リスク：中等度

## レジメン内容

Rp	薬剤名	投与方法	投与時間 (投与速度)	Day																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デキサメタゾン錠	内服	-		●	●																		
2	テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム配合錠	内服	1日2回	●(夕)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(朝)								
3	デキサメタゾン注 パロノセトロン注 生理食塩液 50mL	点滴静注	30分	●																				
4	オキサリプラチン注 (100~130mg/m <sup>2</sup> ) 5%ブドウ糖液 250mL	点滴静注	120分	●																				
5	生理食塩液 50mL	点滴静注	15分	●																				

### 【備考】

吐き気の状態に応じてアプレピタントを併用する場合があります。

#### 【テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム投与量】

- 1.25m<sup>2</sup>未満 : 40mg/回
- 1.25m<sup>2</sup>~1.5m<sup>2</sup> : 50mg/回
- 1.5m<sup>2</sup>以上 : 60mg/回

#### 【腎機能低下時のテガフル・ギメラシル・オテラシルカリウムの用量】

- 60mL/min ≤ Ccr < 80mL/min : 必要に応じ1段階減量
- 30mL/min ≤ Ccr < 60mL/min : 原則1段階減量
- Ccr < 30mL/min : 投与禁忌